



MEDICAMENTOS CON CITISINA (TODACITAN EFG; RECIGARUM EFG): UN ÚNICO ENVASE POR TRATAMIENTO

Se han advertido errores en la posología en la prescripción electrónica de medicamentos con citisina, para la dependencia tabáquica, que generan más de un envase dispensable, cuando los envases de estos medicamentos (Todacitan EFG®; Recigarum EFG®) son de 100 comprimidos, suficientes para completar los 25 días del tratamiento.

Pauta tratamiento establecida en *Ficha técnica* de los medicamentos con citisina:

Días de tratamiento	Dosis recomendada	Dosis diaria máxima
Del 1.º al 3.º día	1 comprimido cada 2 horas	6 comprimidos
Del 4.º al 12.º día	1 comprimido cada 2,5 horas	5 comprimidos
Del 13.º al 16.º día	1 comprimido cada 3 horas	4 comprimidos
Del 17.º al 20.º día	1 comprimido cada 5 horas	3 comprimidos
Del 21.º al 25.º día	1-2 comprimidos al día	Hasta 2 comprimidos

Se debe dejar de fumar a más tardar el 5.º día de tratamiento. No se debe seguir fumando durante el tratamiento porque esto podría empeorar las reacciones adversas. En caso de fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse y podrá reanudarse después de 2 o 3 meses.

En el Sistema Nacional de Salud se financia un intento anual por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacológico y **cada prescripción se realizará por un envase**, lo que equivale a 25 días de tratamiento.

Ante la situación descrita, se sugiere que, en caso de aparecer dispensable en receta electrónica más de un envase de estos medicamentos, **se dispense uno** y se **bloquee cautelarmente** en receta electrónica la dispensación del resto.

A continuación, se informa de esta situación a través del canal de mensajería de receta electrónica al prescriptor. En el caso de que en el centro de salud ya esté habilitado el programa de comunicación con las farmacias, se puede utilizar este recurso para que se advierta al médico del mensaje enviado.

Oviedo, 27 de noviembre de 2023